

## AGAR BIGGY



**USO** El Agar Biggy (por sus siglas en inglés Bismuth-Glucose-Glycine-Yeast) es utilizado para el aislamiento y diferenciación de especies de Candida. También es conocido como Agar de Nickerson.

**EXPLICACIÓN** El Agar Biggy es una modificación de la fórmula desarrollada por Nickerson quién realizó estudios sobre la reducción de sulfito por especies de Candida. La diferenciación está basada en la morfología colonial y la pigmentación típica que se presenta en este medio. La reducción del sulfito de bismuto se manifiesta en una pigmentación de la colonia que en ocasiones difunde en el medio. En este medio el extracto de levadura proporciona vitaminas y aminoácidos. La glicina es utilizada para estimular el crecimiento. La dextrosa es la fuente de carbono. El indicador sulfito de bismuto actúa también como un inhibidor del desarrollo bacteriano. El agar es adicionado como agente solidificante.

**FORMULA**

Citrato de Amonio y Bismuto	5.0	Glicina	10.0
Sulfito de Sodio	3.0	Extracto de Levadura	1.0
Dextrosa	10.0	Agar Bacteriológico	16.0
pH	6.8 ± 0.2		

**PREPARACIÓN** **Método:** Suspender 45 g del medio en un litro de agua purificada. Calentar con agitación suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. NO SOBRECALENTAR. Dejar enfriar a una temperatura entre 45-50°C y vaciar en placas de Petri estériles.

**Procedimiento:**

1. Inocular las placas con la muestra previamente procesada de acuerdo a los procedimientos establecidos.
2. Incubar las placas a 25 ± 2° C durante 5 días.

**RESULTADOS** La morfología colonial típica se describe en la siguiente tabla:

C. albicans	Colonias de color café oscuro o negro sin difusión en el medio, con ligera presencia de micelio y tamaño mediano.	C. krusei	Colonias grandes, planas, rugosas de color negro con brillo metálico, borde café y halo amarillo.
C. tropicalis	Colonias ligeramente oscuras con centro negro y brillante, de tamaño mediano. Después de 72 hrs. El pigmento difunde en el medio.	C. parakruzei	Colonias de tamaño mediano, planas rugosas, café-rojizas, con crecimiento micelial amarillo.
C. pseudotropicalis	Colonias grandes de color rojo oscuro, planas con ligero crecimiento micelial.	C. stellatoidea	Colonias de tamaño mediano, planas, de color café oscuro, con muy pequeña presencia de micelio.

**Almacenamiento:** 2-30°C.

**Caducidad:** 4 años en frasco cerrado.

**Presentación:** Frasco con 450 g  
Caja con 20 sobres para un litro  
Medio preparado en paquete con 10 placas

**BIBLIOGRAFÍA**

1. Nickerson, W.J. 1947. Biology of pathogenic fungus. The Chronica Botanica. Co., Waltman, MA.
2. Nickerson, W.J. 1953. Reduction of inorganic substances by yeasts. J. Extracellular reduction of sulfite by species of Candida. J. Infect. Dis. 93:43
3. Baron, E.J., L.R. Peterson and S.M. Finegold. 1994. Bailey & Scot's diagnostic microbiology, 9th ed. Mosby-Year Book, Inc. St. Louis, MO.
4. MacFaddin, J.D. 1985. Media for isolation-cultivation-identification-maintenance of medical bacteria, vol. I, p. 65-68. Williams & Wilkins, Baltimore, MD.

